



## 마이코플라즈마 Mycoplasma Genitalium (Korean)

### 마이코플라즈마란?

마이코플라즈마 제니탈리움은 요도, 자궁경부, 항문을 감염시키는 박테리아입니다.

### 마이코플라즈마균에 어떻게 감염되나요?

콘돔 등을 사용하지 않는 무방비 질성교와 항문성교를 통해 감염됩니다.

### 마이코플라즈마 감염 증상은 무엇인가요?

남성	여성
일부 남성들은 아무 증상이 없습니다.	일부 여성들은 아무 증상이 없습니다.
증상이 있는 경우, 다음을 포함할 수 있습니다:	증상이 있는 경우, 다음을 포함할 수 있습니다:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 소변을 볼 때 느껴지는 통증</li> <li>▪ 고환 분비물</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 아랫배 통증</li> <li>▪ 성교시 통증</li> <li>▪ 비정상적인 질 분비물</li> <li>▪ 소변을 볼 때 느껴지는 통증</li> <li>▪ 비정상적인 질 출혈</li> </ul>

### 마이코플라즈마는 어떻게 검사하나요?

남성은 소변샘플, 요도 또는 항문세포 채취를 통해 감염여부를 검사합니다. 여성은 소변샘플, 질세포 또는 자궁경부세포 채취를 통해 검사합니다.

### 마이코플라즈마는 어떻게 치료하나요?

MSHC는 두 가지 항생제로 마이코플라즈마 감염증을 치료합니다. 두 항생제 다 복용해야 감염을 치료할 수 있습니다.

### 언제 다시 성관계를 갖는 것이 안전한가요?

여러분과 여러분의 파트너가 마이코플라즈마 검사에 음성반응을 보일 때까지 성관계를 가지지 않거나, 성관계시 한번도 빠짐없이 콘돔을 사용해야 합니다.

### 치료를 받은 후에도 추가 검사를 받아야 하나요?

네. 치료 개시 후 한 달이 경과하면 완치여부를 알아내는 검사를 통해 항생제의 효과가 있었는지 확인해야 합니다.

### 성파트너도 치료를 받아야 하나요?

네. 최근 성관계를 가진 모든 파트너들에게 마이코플라즈마 감염 진단을 받았다는 사실을 알리고 치료를 권유하십시오. 본 기관은 다른 곳에서 구하기 어려운 항생제를 사용하므로 가능하면 MSHC에서 치료받도록 권유하십시오. 파트너에게 감염사실을 알리는 것이 어렵다면 [www.letthemknow.org.au](http://www.letthemknow.org.au) 웹사이트를 이용하세요. 마이코플라즈마 감염 검사는 일부 클리닉에서만 받으실 수 있습니다.

### 재감염을 막는 방법은 무엇인가요?

질 또는 항문성교시 항상 콘돔을 사용하면 재감염을 막을 수 있습니다.