

生殖器支原体

Mycoplasma Genitalium (Chinese Simplified)

什么是生殖器支原体？

What is Mycoplasma Genitalium?

生殖器支原体是一种感染尿道、子宫颈、咽喉和肛门黏膜的细菌。

如何传染？

How is it transmitted?

生殖器支原体通过阴道性交、肛交和口交传染。

有哪些迹象和症状？

What are the signs and symptoms?

男性 (Men)

有些男性没有任何症状。如果出现症状，可能是：

- 尿道发炎；
- 小便时有刺痛或灼痛感；
- 尿道口分泌物。

女性 (Women)

人们对女性生殖器支原体感染的了解较少。但是，生殖器支原体已经证明会感染子宫颈。女性的相关症状可能有：

- 盆腔疼痛和性交过程中疼痛；
- 异常阴道分泌物；
- 窥镜检查发现子宫颈发红、发炎（子宫颈炎）。

症状形成需要多少时间？

How long until symptoms develop?

生殖器支原体最近被确定为性传染病。症状会在1到3个星期内形成，然而潜伏期尚未确定。

如何检测生殖器支原体？

How do you test for Mycoplasma Genitalium?

检测生殖器支原体，男性是通过尿检或尿道或肛门刮拭（分泌物取样）检测，女性则是通过尿检或子宫颈分泌物刮拭检测。

如何治疗生殖器支原体？

How is Mycoplasma Genitalium treated?

生殖器支原体可通过口服抗生素有效治疗。通常的处方为单剂口服抗生素（阿奇霉素）。

什么时候才能再有性生活？

When is it safe to have sex again?

为了让抗生素有时间生效，你在结束治疗后一星期内应该使用避孕套或避免性交。

治疗后是否需要更多检测？

Do I need further tests after I've been treated?

是的。治疗后一个月应接受一次测试，以确保抗生素生效。在很少的情况下，可能需要再服用一个疗程的抗生素。

我的性伴侣是否也应该接受治疗？

Should my sexual partners also be treated?

是的。你应该告诉你最近所有的性伴侣，你被诊断有生殖器支原体，并要求他们接受治疗，这很重要。我们可以提供相关帮助，给你一封信让你给他们，你也可以使用“让他们知道（Let Them Know）”网站 www.letthemknow.org.au 通过短消息或电子邮件匿名告诉你的性伴侣。生殖器支原体检测只有一些诊所提供。

如何避免再次感染？

How do I avoid getting Mycoplasma Genitalium again?

阴道性交和肛交时一直使用避孕套，即开展安全性行为。