



生殖支原體

Mycoplasma Genitalium (Chinese Traditional)

什麼是生殖支原體？

What is Mycoplasma Genitalium?

生殖支原體是一種感染尿道、子宮頸、喉嚨和肛門粘膜的細菌。

如何傳播的？

How is it transmitted?

通過陰道性交、肛交和口交傳播。

有什麼跡象和症狀？

What are the signs and symptoms?

男性 (Men)

有些男子沒有症狀。若有，會有如下症狀：

- 尿道（排尿的通道）發炎；
- 排尿時刺痛或燒灼感；
- 陰莖排出分泌物。

女性 (Women)

女子感染生殖支原體比較少見。但有生殖支原體感染子宮頸的情況。

有症狀的女子可有如下情況：

- 盤腔部位疼痛，性交時疼痛；
- 陰道排出異常分泌物；
- 窺鏡檢查可見子宮頸發紅，發炎（宮頸炎）。



會經過多長時間才出現症狀？

How long until symptoms develop?

生殖支原體最近被確認為是通過性行為傳播的感染。雖然潛伏期仍未能被確定，但症狀會在1到3週的期間內出現。

如果檢查生殖支原體？

How do you test for Mycoplasma Genitalium?

對於男性，我們會通過尿樣或從尿道或肛門以棉籤取樣（採集分泌物樣本）來檢查生殖支原體。對女性會通過尿樣或從子宮頸以棉籤採集分泌物檢查生殖支原體。

如何治療生殖支原體？

How is Mycoplasma Genitalium treated?

口服抗菌素能有效地治療生殖支原體。醫生通常會開單次藥劑的口服抗菌素（Azithromycin）進行治療。

什麼時候可以安全地恢復性生活？

When is it safe to have sex again?

為了讓抗菌素發揮作用，應停止性生活，或者在接受治療之後一週的期間內使用避孕套。

接受治療之後需要接受進一步檢查嗎？

Do I need further tests after I've been treated?

需要。接受治療一個月之後接受檢驗，以確定抗菌素是否起效。在極偶然的情況下，需要接受第二個療程的抗菌素治療。

性侶伴也需要接受治療嗎？

Should my sexual partners also be treated?

需要。應當向所有最近的性侶伴說明您被診斷出生殖支原體感染，並要求他們接受治療。我們可協助您通知他們，可給您一份通知他們的信函，或可利用“Let Them Know” www.letthemknow.org.au 匿名發文字短訊或電子郵件通知他們。只有部分診所提供對生殖支原體的檢驗。

我如何避免再次感染生殖支原體？

How do I avoid getting Mycoplasma Genitalium again?

進行陰道性交和肛交時一定要使用避孕套，例如：採取安全性行為措施。